

脳腫瘍

改定日 2023.7.1

脳腫瘍：Bev療法（2週）

| | Day（1コースの日数：14日） | |
|---|------------------|----|
| | 1 | 14 |
| 生理食塩液 100ml 1瓶 アバスタン点滴静注用 10mg/kg 全量100mL 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 | ● | |

脳腫瘍：ACNU療法

| | Day（1コースの日数：42日） | |
|---|------------------|----|
| | 1 | 42 |
| デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 フリンペラン注射液10mg 0.5%2mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 ニドラン投与前に | ● | |
| ブドウ糖注 5% 250mL … 1袋 注射用水 20mL … 1管 ニドラン注射用 80mg/m ² ニドラン50mgあたり注射用水10mLで溶解 2時間かけて | ● | |

脳腫瘍：Bev療法(3週)

| | Day (1コースの日数：21日) | |
|---|-------------------|----|
| | 1 | 21 |
| 生理食塩液 100ml 1瓶 アバスタン点滴静注用 15mg/kg 全量100mL 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 | ● | |

脳腫瘍：ACNU+Bev療法

| | Day (1コースの日数：42日) | | |
|---|-------------------|----|----|
| | 1 | 22 | 42 |
| 生理食塩液 100ml 1瓶 アバスチン点滴静注用 15mg/kg 全量100mL 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 | ● | ● | |
| テカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 コドラン投与前に | ● | | |
| ブドウ糖注 5% 250mL … 1袋 注射用水 20mL … 1管 コドラン注射用 80mg/m ² コドラン50mgあたり注射用水10mLで溶解 2時間かけて | ● | | |

脳腫瘍：R-MPV療法①

| | Day (1コースの日数：14日) | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
| 生理食塩液 50mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ポラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 ①15分 | ● | | | | | | |
| 生理食塩液(ソトバッグ) 500mL … 1袋 リツキ注375mg/m ² ②30分毎に順次速度上げて投与可 | ● | | | | | | |
| (後発)ソルテム1輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ①3時間 | | ● | | | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 (後発)ホスアプ レビタント点滴静注150mg … 1瓶 ②30分 | | ● | | | | | |
| パロセトン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 ③15分 | | ● | | | | | |
| 生理食塩液 50mL … 1瓶 オンコピン注射用 1.4mg/m ² ④全開投与 | | ● | | | | | |
| 生理食塩液500ml【規格分解用】… 500ml メソレキセート点滴 3500mg/m ² 全量500ml⑤3時間 | | ● | | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑥3時間 | | ● | | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑦3時間 | | ● | | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑧3時間 | | ● | | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml 2管⑨翌日1本目開始までキープ | | ● | | | | | |

脳腫瘍：R-MPV療法②

| | Day (1コースの日数：14日) | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ①3時間 | | | ● | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ②3時間 | | | ● | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ③4時間 | | | ● | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ④3時間 | | | ● | | | | |
| ロコボ [®] リン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑤側管から メトトレキサート開始24時間後に投与 | | | ● | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑥4時間 | | | ● | | | | |
| ロコボ [®] リン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑦側管から | | | ● | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑧3時間 | | | ● | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑦3時間 | | | ● | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑧4時間 | | | ● | | | | |
| ロコボ [®] リン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑨側管から | | | ● | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑩4時間 | | | ● | | | | |
| ロコボ [®] リン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑪側管から | | | ● | | | | |

脳腫瘍：R-MPV療法③

| | Day (1コースの日数：14日) | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ①4時間 | | | | ● | ● | ● | |
| ロイコリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ②側管から | | | | ● | ● | ● | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ③3時間 | | | | ● | ● | ● | |
| ロイコリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ④側管から | | | | ● | ● | ● | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑤6時間 | | | | ● | ● | ● | |
| ロイコリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑥側管から | | | | ● | ● | ● | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑦6時間 | | | | ● | | ● | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml 2管 ⑦翌日の1本目開始までキープ | | | | | ● | | |
| ロイコリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑧側管から | | | | ● | ● | ● | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml 2管 ⑨翌日1本目開始までキープ | | | | ● | | | |
| ロイコリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑩側管から | | | | ● | | | |

脳腫瘍：HD-AraC療法

| | Day（1コースの日数：28日） | |
|--|------------------|----|
| | 1 | 28 |
| グレーストン点滴バッグ 3mg100mL ... 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL ... 1.5瓶 30分 | ● | |
| 生理食塩液500ml 500ml キロサイトN注 2000mg/m ² 全量500ml 3時間 | ● | |