

泌尿器癌

改定日 2023.7.1

膀胱癌：GC療法

| | Day (1コースの日数 : 21日) | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 21 |
| 生理食塩液 50mL 1瓶 テカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 15分 | ● | | | | ● | |
| 生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタピン点滴静注用 1000mg/m ² 30分 | ● | | | | ● | |
| 生理食塩液(ソフトバグ) 1L 1袋 250mL/h | ● | | | | ● | |
| 生理食塩液(ソフトバグ) 1L 1袋 250mL/h | | ● | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバグ) 1L 1袋 250mL/h | | ● | | | | |
| プロイメント 点滴静注用150mg 1瓶 生理食塩液 100mL 1瓶 30分 | | ● | | | | |
| パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 テカトロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 30分 | | ● | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバグ) 500mL 1袋 シスプラチン注 70mg/m ² 2時間 | | ● | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバグ) 1L 1袋 250mL/h | | ● | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバグ) 1L 1袋 250mL/h | | ● | | | | |
| 生理食塩液 100mL 1瓶 テカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 30分 | | | ● | ● | | |

前立腺癌:DTX療法

| | Day (1コースの日数 : 21日) | |
|---|---------------------|----|
| | 1 | 21 |
| デカドロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 生理食塩液 50mL 1瓶 | ● | |
| 生理食塩液 250mL 1袋 ドセタキセル点滴静注 70mg/m ² 1時間以上かけて | ● | |

胚細胞腫瘍：BEP療法①

| | Day (1コースの日数：21日) | | | | | |
|--|-------------------|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ①2時間 | ● | | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ②2時間 | ● | | | | | |
| (後発)ホスアプレピタント点滴静注150mg … 1瓶 生理食塩液 100mL … 1瓶 ③30分 | ● | | | | | |
| ケラセトロン点滴バッグ 3mg/100mL … 1袋 テカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ④30分 | ● | | | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ブレイ注射用 30mg/body ⑤30分間 | ● | | | | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m ² ⑥1時間 | ● | | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² ⑦2時間 | ● | | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑧3時間 | ● | | | | | |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑦3時間 | ● | | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ⑧2時間 | ● | | | | | |

胚細胞腫瘍：BEP療法②

| | Day (1コースの日数：21日) | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ①2時間 | | ● | ● | ● | ● | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ②2時間 | | ● | ● | ● | ● | | | |
| (後発)ケラセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ③30分 | | ● | ● | ● | ● | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 テカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分 | | | | | | ● | ● | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m ² ④1時間 | | ● | ● | ● | ● | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² ⑤2時間 | | ● | ● | ● | ● | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ブレ注射用 30mg/body 30分間 | | | | | | ● | ● | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ⑥2時間 | | ● | ● | ● | ● | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 100mg/m ² ⑦2時間 | | ● | ● | ● | ● | | | |

陰茎癌：TIP療法（陰茎癌）①

| | Day（1コースの日数：21日） | | | |
|--|------------------|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 21 |
| 叔アピリン点滴静注150mg … 1瓶 生理食塩液 100mL 1瓶 インラインフィルター使用して投与 ①：30分で | ● | | | |
| デキサメタゾン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホルモン注5mg 0.5%1mL … 1管 （後発）フモチジン静注液20mg「サリ」20mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 ②：15分で点滴。 | ● | | | |
| グラニセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 ③：30分 | ● | | | |
| 生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 パクリタキセル注175mg/m ² ④：3時間 | ● | | | |
| ソラセトF 500mL … 1袋 ⑤：1時間 | ● | | | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロキサン注 240mg/m ² ⑥-1：側管より全開で投与。 | ● | | | |
| 生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 休マイド注 1200mg/m ² ⑥-2：1時間30分で点滴。 | ● | | | |
| 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL … 1管 KCL注20mEqキット 20mL … 1キット マイロン静注 7% 20ml … 1管 生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 ⑦：1時間 | ● | | | |
| マンニトールS注射液 300mL … 1袋 ⑧：30分 | ● | | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 シスプラチン25mg/m ² ⑨：1時間 | ● | | | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロキサン注240mg/m ² ⑩：全開で | ● | | | |
| （後発）ソラセトF 500mL … 1袋 ⑪：4時間で点滴。 | ● | | | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロキサン注 240mg/m ² ⑫：全開で | ● | | | |

陰茎癌：TIP療法（陰茎癌）②

| | Day（1コースの日数：21日） | | | |
|---|------------------|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 21 |
| グラセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 ①：15分で点滴。 | | ● | ● | |
| ヲルセトF 500mL … 1袋 ②：1時間で点滴。 | | ● | ● | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ③-1：側管より全開で投与。 | | ● | ● | |
| 生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 休マイト注 1200mg/m ² ③-2：メインから1時間30分で点滴。 | | ● | ● | |
| 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 0.5mL 20mL … 1管 KCL注 20mEqキット 20mL … 1キット メイロン静注 7% 20ml … 1管 生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 ④：1時間 | | ● | ● | |
| マンニトールS注射液 300mL … 1袋 ⑤：30分 | | ● | ● | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 シスプラチン 25mg/m ² ⑥：1時間 | | ● | ● | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ⑦：全開で | | ● | ● | |
| （後発）ヲルセトF 500mL … 1袋 ⑧：4時間で点滴。 | | ● | ● | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ⑨：全開で | | ● | ● | |

膀胱癌：Pemb (200mg/body)

| | Day (1コースの日数 : 21日) | |
|---|---------------------|----|
| | 1 | 21 |
| 生理食塩液 100mL キトルダ [®] 点滴静注 200mg/body 全量100mL インラインフィルターを使用して投与 30分間で施行 | ● | |

尿路癌：GEM+PTX療法（3週）

| | Day（1コースの日数：21日） | | | |
|--|------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| ゲラセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 2.5瓶 （後発）ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ポラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分 | ● | | | |
| ゲラセトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分 | | ● | ● | |
| 生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 パクリタキセル注【200mg/m ² 】 3時間 | ● | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシタビオン点滴静注用 1000mg/m ² 30分 | ● | ● | ● | |

尿路癌：GEM+PTX療法（4週）

| | Day（1コースの日数：28日） | | | |
|--|------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 28 |
| ゲラセトン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカドロン注射液6.6mg 2mL … 2.5瓶 （後発）ファミジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 30分 | ● | | | |
| ゲラセトン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 30分 | | ● | ● | |
| 生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL … 1袋 ハククリタセル注【200mg/m ² 】 3時間 | ● | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ゲムシビロン点滴静注用 1000mg/m ² 30分 | ● | ● | ● | |

腎細胞癌：Nivolumab療法

| | Day (1コースの日数 : 14日) | | |
|--|---------------------|-----|----|
| | 1 | ... | 14 |
| 生理食塩液 100mL 1瓶 オプジーボ点滴静注 240mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL 30分 | ● | | |

腎細胞癌：Nivolumab療法（4週）

| | Day（1コースの日数：28日） | | |
|--|------------------|-----|----|
| | 1 | ・・・ | 28 |
| 生理食塩液 100mL 1瓶 オプジーボ点滴静注 480mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100mL 30分 | ● | | |

前立腺癌：CBZ療法

| | Day (1コースの日数：21日) | |
|---|-------------------|----|
| | 1 | 21 |
| 生理食塩液 100mL 1瓶 テカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 ポラミン注5mg 0.5%1mL 1瓶 (後発)ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL 1瓶 インラインフィルター使用して投与 15分 | ● | |
| 生理食塩液 100mL 1瓶 インラインフィルター使用して投与 30分 | ● | |
| 生理食塩液 250mL 1袋 ジェブ対点滴静注 25mg/m ² インラインフィルター使用して投与 60分 | ● | |

胚細胞癌：VIP療法

| | Day (1コースの日数：21日) | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 |
| ゲラネトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 ホスアプレピタント点滴静注150mg … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ①30分 | ● | | | | | |
| (後発)ゲラネトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ①15分 | | ● | ● | ● | ● | |
| ソルアセトF 500mL … 1袋 ②1時間 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液 50mL … 1瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ③-1：側管より全開で投与 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 イマイト注 1200mg/m ² ③-2：イから2時間で投与 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ソルアセトF 500mL … 1袋 ⑤：1時間 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ⑥-1：側管より全開で投与。 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 メイロン静注 7% 20ml … 1管 ④1時間 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m ² ⑤1時間 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液 50mL … 1瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ⑥側管より全開投与 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ラステット注 75mg/m ² ⑦2時間 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ソルアセトF 500mL … 1袋 ⑧2時間 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液 50mL … 1瓶 カミテキサン注 240mg/m ² ⑨側管より全開投与 | ● | ● | ● | ● | ● | |

精巣腫瘍：TIP療法（精巣腫瘍）①

| | Day（1コースの日数：21日） | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 デカトン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 (後発)ファモチン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 15分 | ● | | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 パクリタセル注 210mg/m ² 3時間 | ● | | | | | |
| グラニセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 ③：30分 | ● | | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 パクリタセル注175mg/m ² ④：3時間 | ● | | | | | |
| ソラセトF 500mL … 1袋 ⑤：1時間 | ● | | | | | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注 240mg/m ² ⑥-1：側管より全開で投与。 | ● | | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 休マイト注 1200mg/m ² ⑥-2：1時間30分で点滴。 | ● | | | | | |
| 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL20mL … 1管 KCL注20mEqキット 20mL … 1キット マイロン静注 7% 20ml … 1管 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 ⑦：1時間 | ● | | | | | |
| マンニトールS注射液 300mL … 1袋 ⑧：30分 | ● | | | | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 シスプラチン25mg/m ² ⑨：1時間 | ● | | | | | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロミテキサン注240mg/m ² ⑩：全開で | ● | | | | | |
| (後発)ソラセトF 500mL … 1袋 ⑪：4時間で点滴。 | ● | | | | | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 | ● | | | | | |

精巣腫瘍：TIP療法(精巣腫瘍)②

| | Day (1コースの日数：21日) | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 |
| グラセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 (後発)ホスアピリタ点静注150mg … 1瓶 ① 30分 | | ● | | | | | |
| グラセロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋 テカロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 ①15分 | | | ● | ● | ● | ● | |
| ソリアセトF 500mL … 1袋 ②1時間 | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロキサン注240mg/m ² ③-1：側管より全開で投与。 | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 体マイト注 1200mg/m ² ③-2：メインから1時間30分で点滴。 | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 マイロン静注 7% 20ml … 1管 ④1時間 | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 シスプラチン注 20mg/m ² ⑤1時間 | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロキサン注240mg/m ² ⑥：全開で | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ソリアセトF 500mL … 1袋 ⑦：4時間で点滴。 | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 0.5瓶 ウロキサン注 240mg/m ² ⑧：全開で | | ● | ● | ● | ● | ● | |

腎細胞癌：Nivo＋Ipil療法

| | Day（1コースの日数：21日） | | |
|---|------------------|-----|----|
| | 1 | ... | 21 |
| 生理食塩液 50mL … 1瓶 ホ°ラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 インラインフィルター使用して投与 15分 | ● | | |
| 生理食塩液100m l 100ml オ°ジ°ホ°点滴静注 240mg/body 全量100ml、30分で施行。 | ● | | |
| 生理食塩液50m l … 50ml ヤ°ホ°イ点滴静注液 化°リムマ° 1mg/kg オ°ジ°ホ°投与完了後30分以上の間隔をおいて30 分で施行。全量50ml | ● | | |

尿路癌:Enfortumab Vedotin療法

| | Day (1コースの日数 : 28日) | | | |
|---|---------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 28 |
| 生理食塩液 50mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 15分 | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液 50mL … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 ハドセブ点滴静注用 1.25mg/kg ハドセブ 30mgあたり注射用水3.3mLで溶解 30分 | ● | ● | ● | |

腎細胞癌：Avelumab療法

| | Day (1コースの日数：14日) | | |
|---|-------------------|-----|----|
| | 1 | ... | 14 |
| アセリア静注液1000mgバッグ 100mL ... 0.5袋 ホラミン注5mg 0.5%1mL ... 1管 インラインフィルター使用して投与 15分 | ● | | |
| 生理食塩液 250mL ... 1袋 パペンチ点滴静注 10mg/kg 60分 | ● | | |


精巣癌：CBDCA療法

| | Day (1コースの日数：28日) | | |
|---|-------------------|-----|----|
| | 1 | ... | 28 |
| ハロセトロン点滴バッグ 0.75mg50mL ... 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL ... 1瓶 テカドロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30分 | ● | | |
| 生理食塩液 250mL ... 1袋 カボプラチン点滴静注液 AUC 7 60分 | ● | | |

膀胱癌：GC外来療法

| | Day (1コースの日数：21日) | | |
|--|-------------------|---|----|
| | 1 | 8 | 21 |
| パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 30分 | ● | | |
| 生理食塩液 100mL 1瓶 デカトロン注射液6.6mg/2mL 1瓶 15分 | | ● | |
| 生理食塩液 100mL 1瓶 ゲムシタヒン点滴静注用 1000mg/m ² 30分 | ● | ● | |
| 生理食塩液(ソフトパック) 500mL 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL 1管 1時間 | ● | | |
| マンニトールS注射液 1袋 1時間 | ● | | |
| 生理食塩液(ソフトパック) 250mL 1袋 シプ ラチン注 70mg/m ² 1時間 | ● | | |
| 生理食塩液(ソフトパック) 500mL 1袋 1時間 | ● | | |

腎細胞癌：Pemb+Lenvatinib

| | Day (1コースの日数 : 21日) | |
|---|---------------------|--|
| | 1 | 21 |
| 生理食塩液 100mL キトルダ [®] 点滴静注 200mg/body 全量100mL インラインフィルターを使用して投与 30分間で施行 | ● | |
| レンバチニブ 1日1回 20mg/body | ● | 連日服用  |