

患者さん用 ベージニオを服用される方へ

患者氏名	様
調剤薬局電話番号	
電話確認日時	年 月 日 時頃

◎ベージニオの服用方法:

1日2回 毎日内服します。

併用するホルモン療法薬(商品名で記載されていますが、後発医薬品も含まれます)

- アリミデックス (アナストロゾール)(毎日内服) アロマシン (エキセメスタン)(毎日内服)
 フェマール (レトロゾール) (毎日内服) ノルバデックス(タモキシフェン) (毎日内服)
 リュープリン(リュープロレリン) (6か月に1回 皮下注射)
 フェソロデックス(フルベストラント) (1か月に1回 筋肉注射)

※最初の8週間で容量を調節するために、2週間ごとに血液検査を行います。

用量が決まったら、4週ごとにお薬を処方します。

◎副作用

下痢と呼吸困難(薬剤性間質性肺炎)に注意が必要です。

血液検査では血球減少、肝機能障害、腎機能障害などがあります。

薬剤性間質性肺炎は命に関わることもあるので、胸部X線、CT検査や呼吸機能検査などを定期的に行います。

この様な症状のために、色がついている部分に該当した場合は、外科外来に直接お電話ください。

副作用の確認に処方1週間後に、調剤薬局から体調確認の電話があります。

Grade	1	2	3
下痢	普段より1-3回/日多い	4-6回/日多い	7回/日以上
悪心	吐き気はあったが食事量は変わらない	吐き気で食事量が減った	吐き気で食事が摂れない
倦怠感	だるさがある 元気がない	身の回り以外の日常生活動作を制限するだるさがある	身の回りの日常生活動作の制限
発熱	37.5-39℃	39-40℃	40℃<
呼吸困難	労作時に息切れ	極めて軽度の労作に伴う息切れ	安静時の労作に伴う息切れ
咳嗽	少し咳があるが、困らない	身の回り以外の日常生活動作の制限される	身の回りの日常生活動作の制限
口内炎	軽度の痛みで食事摂取量は変わらない	痛みがあり、食事に工夫が必要	痛みがあり、食事が摂れない
皮疹	体表面積の<10%を占める皮疹	体表面積の10-30%を占める皮疹	体表面積の30%<を占める皮疹

連絡先: 会津中央病院 内分泌外来 電話番号: 0242-25-1712

担当医: 長谷川翔