

大腸がん

改定日 2025.7.1

大腸癌：mFOLF0X6療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・ ・ ・	14
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※オキサリプラチンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時	●				
生食50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間			

大腸癌：mFOLF0X6＋Bev療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・・・	14
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 100ml 1瓶 アバステン点滴静注用 5mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※オキサリプラチンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時	●				
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間			

大腸癌：P-mab+mFOLF0X6療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・ ・ ・	14
生理食塩液 100ml 1瓶 ベクティビックス点滴静注 6mg/kg 60分 インラインフィルター使用して投与	●				
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※オキサリプラチンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時	●				
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●				

46時間

大腸癌：FOLFIRI療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・・・	14
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※イリノテカンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 90分 ※レボホリナートと同時	●				
生食50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●				

46時間

大腸癌：FOLFIRI + Bev療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・ ・ ・	14
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 100ml 1瓶 アバチン点滴静注用 5mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※イリノテカンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 90分 ※レボホリナートと同時	●				
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間 			

大腸癌：P-mab + FOLFIRI療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・・・	14
生理食塩液 100ml 1瓶 ベクティビックス点滴静注 6mg/kg 60分 インラインフィルター使用して投与	●				
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※イリノテカンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 90分 ※レボホリナート同時	●				
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●				

大腸癌：FOLFIRI＋RAM療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・ ・ ・	14
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 ポララミン注5mg 1管 15分	●				
生理食塩液 250ml 250ml サイラムザ点滴静注 8mg/kg 60分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 初回のみサイラムザ投与後1時間空ける 120分 ※イリノテカンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 初回のみサイラムザ投与後1時間空ける 90分 ※レボホリナート同時	●				
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間			

大腸癌：SOX療法

	Day（1コースの日数：21日）				
	1	2	3	・ ・ ・	21
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 130mg/m ² 120分	●				
S-1 80mg/m ² 2週間服用1週間休薬	●	●	●		

大腸癌：S0X+Bev療法

	Day（1コースの日数：21日）				
	1	2	3	・ ・ ・	21
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 100ml 1瓶 アバスチン点滴静注用 7.5mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 130mg/m ² 120分	●				
S-1 80mg/m ² 2週間服用1週間休薬	●	●	●		

大腸癌：S0X+Pmab療法

	Day（1コースの日数：21日）				
	1	2	3	・ ・ ・	21
生理食塩液 100ml 1瓶 ベクティビックス点滴静注 6mg/kg 60分 インラインフィルター使用して投与	●				
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 130mg/m ² 120分	●				
S-1 80mg/m ² 2週間服用1週間休薬	●	●	●		

大腸癌：XELOX療法

	Day（1コースの日数：21日）				
	1	2	3	・ ・ ・	21
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 130mg/m ² 120分	●				
カペシタビン 1000mg/m ² 2週間服用1週間休薬	●	●	●		

大腸癌：XELOX+Bev療法

	Day（1コースの日数：21日）				
	1	2	3	・ ・ ・	21
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 100ml 1瓶 アバスチン点滴静注用 7.5mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 130mg/m ² 120分	●				
カペシタビン 1000mg/m ² 2週間服用1週間休薬	●	●	●		

大腸癌：FOLF0XIRI療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・ ・ ・	14
グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 165mg/m ² 60分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※オキサリプラチンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間			

大腸癌：FOLF0XIRI+Bev療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・・・	14
グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 100ml 1瓶 アバスチン点滴静注用 5mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 165mg/m ² 60分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※オキサリプラチンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間			

大腸癌：sLV5FU2療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・・・	14
生食50ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 15分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分	●				
生食50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間 			

大腸癌：Pmab療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・ ・ ・	14
生理食塩液 100ml 1瓶 ベクティビックス点滴静注 6mg/kg 60分 インラインフィルター使用して投与	●				

大腸癌：IRIS療法

	Day（1コースの日数：28日）				
	1	・ ・ ・	15	・ ・ ・	28
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●		●		
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 125mg/m ² 90分	●		●		
S-1 80mg/m ² 2週間服用2週間休薬	●				

大腸癌：IRIS+Bev療法

	Day（1コースの日数：28日）				
	1	．．．	15	．．．	28
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●		●		
生理食塩液 100ml 1瓶 アバスチン点滴静注用 5mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●		●		
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 125mg/m ² 90分	●		●		
S-1 80mg/m ² 2週間服用2週間休薬	●				

大腸癌：CPT-11単独療法

	Day（1コースの日数：28日）				
	1	・ ・ ・	15	・ ・ ・	28
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●		●		
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 90分	●		●		

大腸癌：CPT-11+P-mab療法

	Day（1コースの日数：28日）				
	1	・ ・ ・	15	・ ・ ・	28
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分 インラインフィルター使用して投与	●		●		
生理食塩液 100ml 1瓶 ベクティビックス点滴静注 6mg/kg 60分	●		●		
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 90分	●		●		

大腸癌：CDDP+ETP療法

	Day（1コースの日数：21日）				
	1	2	3	・・・	21
生理食塩液(ソフトバグ [®]) 1L 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5mL/20mL 1管 (後発)KCL注20mEqキット 20mL 0.5キット 2時間 ①(主ルート①)	●				
生理食塩液(ソフトバグ [®]) 1L … 1袋 22時間 ②(主ルート②)	●				
生理食塩液 100mL 1瓶 (後発)ホスアブ [®] レピ [®] タント点滴静注150mg 1瓶 30分 ③(側ルート①)	●				
パ [®] ロノセトロン点滴静注バグ [®] 0.75mg50mL 1袋 デ [®] カ [®] ロン注射液6.6mg 2mL 1瓶 15分 ④(側ルート②)	●				
生理食塩液(ソフトバグ [®]) 500mL 1袋 ラステット注 100mg/m ² 2時間 ⑤(側ルート③)	●				
(後発)70セミ [®] 注射液 20mg 1管 生理食塩液 100mL 1瓶 15分 ⑥(側ルート④)	●				
生理食塩液(ソフトバグ [®]) 500mL 1袋 シス [®] ラチン注80mg/m ² 2時間 ⑦(側ルート⑤)	●				
(後発)ソルデ [®] ム1輸液 500mL 3袋 24時間持続 ①(主ルート①)		●	●		
デ [®] カ [®] ロン注射液6.6mg 2mL 1瓶 生理食塩液 50mL 1瓶 15分 ②(側ルート①)		●	●		
生理食塩液(ソフトバグ [®]) 500mL 1袋 ラステット注 100mg/m ² 2時間 ③(側ルート②)		●	●		

大腸癌：TAS102+Bev療法

	Day（1コースの日数：28日）				
	1	．．．	15	．．．	28
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●		●		
生理食塩液 100ml 1瓶 アバスチン点滴静注用 5mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●		●		
ロンサーフ 70mg/m ² 5日間服用2日間休薬を2回繰り返し、 2週間休薬	●				

大腸癌：SIRB療法

	Day（1コースの日数：21日）				
	1	2	3	・ ・ ・	21
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 100ml 1瓶 アバスチン点滴静注用 7.5mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 90分	●				
S-1 80mg/m ² 2週間服用1週間休薬	●	●	●		

大腸癌：Enco+Bini+Cetu療法（初回）療法

	Day（1コースの日数：7日）				
	1	2	3	．．．	7
生理食塩液 100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 ポララミン注5mg 1管 30分	●				
生理食塩液（ソフトバッグ） 500mL 1袋 アービタックス注射液 400mg/m ² 120分	●				
ビラフトビ 連日服用	●	●	●		●
メクトビ 連日服用	●	●	●		●

大腸癌：Enco+Bini+Cetu療法(2回目以降)療法

	Day (1コースの日数：7日)				
	1	2	3	...	7
生理食塩液 100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 ポララミン注5mg 1管 30分	●				
生理食塩液(ソフトバッグ) 250mL 1袋 アービタックス注射液 250mg/m ² 60分	●				
ビラフトビ 連日服用	●	●	●		●
メクトビ 連日服用	●	●	●		●

大腸癌：【BS】mFOLF0X6＋Bev療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・・・	14
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 100ml 1瓶 ベバシズマブBS点滴静注用 5mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※オキサリプラチンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時	●				
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間			

大腸癌：【BS】 FOLFIRI + Bev療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・ ・ ・	14
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 100ml 1瓶 ペバシズマブBS点滴静注用 5mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※イリノテカンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 90分 ※レボホリナートと同時	●				
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間 			

大腸癌：FOLFIRI+Cmab療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・・・	14
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 ホルミン注5mg 1管 15分	●				
生理食塩液 250ml 1袋 アービタックス注 500mg/m ² 120分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※イリノテカンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 90分 ※レボホリナート同時	●				
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●				

大腸癌：FOLF0X6+Cmab療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・・・	14
パノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 ホラミン注5mg 1管 15分	●				
生理食塩液 250ml 1袋 アヒックス注 500mg/m ² 120分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※オキサリプラチンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注 85mg/m ² 120分 ※レボホリナート同時	●				
生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間 			

大腸癌：Cmab療法（初回）

	Day（1コースの日数：7日）				
	1	2	3	・・・	7
生食50mL デカドロン注射液6.6mg/2ml ホルタミン注5mg 15分	●				
生理食塩液 500ml 1袋 アービタックス注 400mg/m ² 120分	●				

大腸癌：Cmab療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：7日）				
	1	2	3	・・・	7
生食50mL 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 ホルラミン注5mg 1管 15分	●				
生理食塩液 250ml 1袋 アービックス注 250mg/m ² 60分	●				

肛門癌：S-1+MMC療法（初回）

	Day（1コースの日数：28日）				
	1	・ ・ ・	14	・ ・ ・	28
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 50ml 1瓶 マイトマイシン注 10mg/m ² 全開	●				
S-1 60mg/m ² day1-14, day29-42	●	●	●		

肛門癌：S-1+MMC療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）				
	1	・ ・ ・	14	・ ・ ・	21
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 50ml 1瓶 マイトマイシン注 10mg/m ² 全開	●				
S-1 60mg/m ² day1-14, day29-42	●				

大腸癌：Cape0X+Pmab療法

	Day（1コースの日数：21日）				
	1	2	3	・ ・ ・	21
生理食塩液 100ml 1瓶 ベクティビックス点滴静注 6mg/kg 60分	●				
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 130mg/m ² 120分	●				
カペシタビン 1000mg/m ² 2週間服用1週間休薬	●	●	●		

大腸癌：PER＋HER療法（初回）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 パージェタ点滴静注 840mg/body 60分	●			
生理食塩液250ml 1袋 ハーセプチン注射用 8mg/kg 90分	●			

大腸癌：PER＋HER療法（2回目以降）

	Day（1コースの日数：21日）			
	1	8	15	21
生理食塩液250ml 1袋 パージェタ点滴静注 420mg/body 30分	●			
生理食塩液100ml 1袋 ハーセプチン注射用 6mg/kg 30分	●			

肛門癌：MMC+5-FP療法

	Day（1コースの日数：28日）						
	1	2	3	4	5	...	28
生理食塩液50ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 側管 15分	●	●	●	●	●		
生理食塩液50ml 1瓶 マイトマイシン注 10mg/m ² 全開	●						
生理食塩液（ソフトバッグ）1000ml 1袋 5FU注 750mg/m ² メイン 24時間	●	●	●	●	●		

大腸癌：FOLFOXIRI+Bev療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・ ・ ・	14
パロセチン点滴バッグ 0.75mg/50ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 アロカス点滴静注 235mg 10mL 1瓶 30分	●				
生理食塩液 100ml 1瓶 アバスチン点滴静注用 5mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 イリノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 60分					
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※オキサリプラチンと同時	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●				

大腸癌：5-FU+I-LV+Bev療法

	Day（1コースの日数：14日）				
	1	2	3	・・・	14
生理食塩液 50ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分	●				
生理食塩液 100ml 1瓶 アバスチン点滴静注用 5mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分	●				
ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分	●				
生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用	●	46時間			

肛門癌：CDDP+5FU療法

	Day (1コースの日数：28日)						
	1	2	3	4	5	...	28
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋 5-FU注 750mg/m ² 24時間かけて	●						
KN補液3号液 500mL... 1袋 2時間 側管①	●						
(後発)フゼミト 注射液20mg ...0.5管 ①と同時に 静脈注射	●						
ハロセトン点滴静注ハッグ 0.75mg50mL ... 1袋 デカトロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 アクリス注235mg 1瓶 30分間かけて 側管②	●						
生理食塩液500mL ... 500mL シスプラチン注 75mg/m ² 120分間かけて 側管③ 2時間	●						
(後発)フゼミト 注射液20mg ...0.5管 ③終了後 静脈注射	●						
KN補液3号液 500mL... 1袋 2時間 側管④	●						
生理食塩液(ソトハッグ) 1L ... 1袋 5-FU注 750mg/m ² 24時間かけて		●	●	●	●		
生理食塩液 100mL ... 1瓶 デカトロン注射液6.6mg 2mL ... 1瓶 30分間かけて		●	●				
フィゾール3号輸液 500mL ... 1袋 2時間かけて		●	●				
(後発)ソラセトF 1L ... 1袋 (後発)フゼミト 注射液20mg ...0.5管4時間かけて		●	●				

大腸癌：Pemb200mg/body療法

	Day（1コースの日数：21日）		
	1	・・・	21
生理食塩液100ml … 100ml キトルダ® 点滴静注 200mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行	●		

大腸癌：Pemb400mg/body療法

	Day（1コースの日数：42日）		
	1	・・・	42
生理食塩液100ml … 100ml キトルダ® 点滴静注 400mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行	●		