

胃がん

改定日 2025.12.1

胃癌：XP+HER療法(初回)

| | Day (1コース：21日間) | | | | |
|---|-----------------|---|---|------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 |
| 生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 90分 | ● | ● | ● | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 ハセフ [®] チゾ注 8mg/kg 90分 | ● | | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ホスアブ [®] レビ [®] タント点滴静注150mg … 1瓶 30分 | ● | | | | |
| ハロノセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分 | ● | | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 30分 | | ● | ● | | |
| 生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 シス [®] ラチゾ注 80mg/m ² 120分 | ● | | | | |
| 生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 90分 | ● | | | | |
| (経口) カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回 | ● | | | 14日間 | |

胃癌：XP+HER療法(2回目以降)

| | Day (1コース：21日間) | | | | |
|---|-----------------|---|---|------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 |
| 生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 90分 | ● | ● | ● | | |
| 生理食塩液 100mL … 1袋 ハセフ [®] チゾ注 6mg/kg 30分 | ● | | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ホスアブ [®] レビ [®] タント点滴静注150mg … 1瓶 30分 | ● | | | | |
| ハロノセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分 | ● | | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 30分 | | ● | ● | | |
| 生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 シス [®] ラチゾ注 80mg/m ² 120分 | ● | | | | |
| 生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 90分 | ● | | | | |
| (経口) カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回 | ● | | | 14日間 | |

胃癌：G-SOX療法

| | Day (1コース : 21日間) | | | |
|---|-------------------|------|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| パロセトロント点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖注5%500ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 100mg/m ² 120分 | ● | | | |
| (経口) S-1 1回40mg/m ² 1日2回 | ● | 14日間 | | |

胃癌：G-SOX+Nivo療法

| | Day (1コース：21日間) | | | |
|--|-----------------|------|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| パロナセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 15分 | ● | | | |
| 生理食塩液100mL … 100mL オブジーボ点滴静注 360mg/body 全量100mL 30分 | ● | | | |
| ブドウ糖注5%500mL 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 100mg/m ² 120分 | ● | | | |
| (経口) S-1 1回40mg/m ² 1日2回 | ● | 14日間 | | |

胃癌：RAM+PTX療法

| | Day (1コースの日数：28日) | | | |
|---|-------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 28 |
| グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 ファモチジン注射用20mg 1管 ポララミン注5mg/0.5%1ml 1管 30分 | ● | ● | ● | |
| 生食250ml 1袋 サイラムザ点滴静注液 8mg/kg 60分 全量250ml | ● | | ● | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 パクリタキセル注 80mg/m ² 60分 | ● | ● | ● | |

胃癌：RAM+nab-PTX療法

| | Day (1コースの日数：28日) | | | |
|---|-------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 28 |
| グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 ファモチジン注射用20mg 1管 ポララミン注5mg/0.5%1ml 1管 30分 | ● | | ● | |
| グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 ファモチジン注射用20mg 1管 30分 | | ● | | |
| 生食250ml 1袋 サイラムザ点滴静注液 8mg/kg 60分 全量250ml | ● | | ● | |
| 生食100ml アブラキサン点滴静注用 100mg/m ² 30分 | ● | ● | ● | |

胃癌：RAM療法

| | Day (1コースの日数：14日) | |
|--|-------------------|----|
| | 1 | 14 |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ホラミン注5mg 0.5%1mL … 1管 30分 | ● | |
| 生食250ml 1袋 サイラムザ点滴静注液 8mg/kg 60分 全量250ml | ● | |

胃癌：CapeOX療法

| | Day (1コース：21日間) | | | |
|--|-----------------|------|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1瓶 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖注5%500ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 130mg/m ² 120分 | ● | | | |
| (経口) カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回 | ● | 14日間 | | |

胃癌：CapeOX+Nivo療法

| | Day (1コース : 21日間) | | | |
|--|-------------------|------|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg/2mL … 1瓶 15分 | ● | | | |
| 生理食塩液 100mL 100mL オフジード 点滴静注 360mg/body 30分 全量100mL | | | | |
| ブドウ糖注5% 500mL 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 130mg/m ² 120分 | ● | | | |
| (経口) カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回 | ● | 14日間 | | |

胃癌：weekly-PTX療法

| | Day (1コースの日数：28日) | | | |
|---|-------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 28 |
| グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 ファモチジン注射用20mg 1管 ポララミン注5mg/0.5%1ml 1管 30分 | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 パクリタキセル注 80mg/m ² 60分 | ● | ● | ● | |

胃癌：Nivo療法

| | Day (1コースの日数：14日間) (13日間は休薬) | | |
|--|---------------------------------|---|----|
| | 1 | 8 | 14 |
| 生理食塩液100mL… 100mL オブジーボ点滴静注 240mg/body 30分 全量100mL | ● | | |

胃癌：S-1+DTX療法

| | Day (1コース：21日間) | | | |
|--|-----------------|------|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖注5%250ml 1袋 ドセタキセル点滴静注 40mg/m ² 60分 | ● | | | |
| (経口) S-1 1回40mg/m ² 1日2回 | ● | 14日間 | | |

胃癌：DTX療法

| | Day (1コース : 21日間) | | | |
|--|-------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| デカドロン注射液6.6mg/2ml 1瓶 グラニセトロン点滴バッグ3mg/100ml 1袋 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖注5%250ml 1袋 ドセタキセル点滴静注 60mg/m ² 60分 | ● | | | |

胃癌：CPT-11+CDDP療法

| | Day (1コース：21日間) | | | | |
|---|-----------------|---|---|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 |
| 生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 90分 | ● | ● | ● | | |
| マンニットールS注射液 300mL … 1袋 60分 | ● | | | | |
| パロノセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分 | ● | | | ● | |
| デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分 | | ● | ● | | |
| ブドウ糖液 5% 500ml … 1袋 リノテカン塩酸塩点滴静注 70mg/m ² 90分 | ● | | | ● | |
| 生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 シスプラチナ 80mg/m ² 120分 | ● | | | | |
| 生理食塩液(ソフトパック) 500mL … 1袋 90分 | ● | ● | ● | | |

胃癌：CPT-11+S-1療法

| | Day (1コース：35日間) | | | |
|--|-----------------|------|----|----|
| | 1 | 15 | 22 | 35 |
| パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分 | ● | ● | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 リバケン塩酸塩点滴静注 80mg/m ² 90分 | ● | ● | | |
| (経口) S-1 1回40mg/m ² 1日2回 | ● | 21日間 | | |

胃癌：CPT-11単独療法

| | Day (1コース：35日間) | | | |
|---|-----------------|----|----|----|
| | 1 | 15 | 22 | 35 |
| パロセトム点滴静注パック 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg/2mL … 1.5瓶 15分 | ● | ● | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 イノテカン塩酸塩点滴静注 150mg/m ² 90分 | ● | ● | | |

胃癌 : SP+HER療法(初回)

| | Day (1コースの日数 : 35日) | | | | | |
|---|---------------------|---|---|----|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 |
| (経口) S-1 1回40mg/m ² 1日2回 | ● | | 21日間  | | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 ハセプロチニン注射用 8mg/kg 90分 | | ● | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 0.5管 60分 | | ● | ● | ● | | |
| パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分 | | ● | | | | |
| マンニットールS注射液 300mL … 1袋 60分 | | ● | | | | |
| 生食 500ml 1袋 シスプラチン注 60mg/m ² 120分 | | ● | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 0.5管 120分 | | ● | | | | |

胃癌 : SP+HER療法(2回目以降)

| | Day (1コースの日数: 35日) | | | | | |
|--|--------------------|---|---|----|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 |
| (経口) S-1 1回40mg/m ² 1日2回 | ● | | 21日間  | | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 ハセプロチニン注射用 6mg/kg 30分 | | ● | | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 0.5管 60分 | | ● | ● | ● | | |
| パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分 | | | ● | | | |
| マンニットールS注射液 300mL … 1袋 60分 | | | ● | | | |
| 生食 500ml 1袋 シスプラチン注 60mg/m ² 120分 | | | ● | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 1L … 1袋 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 0.5管 120分 | | | ● | | | |

胃癌：SP (S-1+CDDP) 療法

| | Day (1コースの日数：35日) | | | | | |
|---|-------------------|------|----|----|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 |
| (経口) S-1 1回40mg/m ² 1日2回 | ● | 21日間 | | | | |
| 生食500ml 1袋 90分 | | ● | ● | ● | | |
| マンニットール注射液20%300ml 1瓶 60分 | | ● | | | | |
| 生食100ml 1瓶 ホスアプレビタント注150mg 1瓶 30分 | | ● | | | | |
| ハロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 15分 | | ● | | | | |
| 生食 500ml 1袋 シスプラチナ注 60mg/m ² 120分 | | ● | | | | |
| 生食100ml 1瓶 デカドロン注射液6.6mg/2mL 1.5瓶 30分 | | | ● | ● | | |
| 生食 500ml 1袋 90分 | | ● | ● | ● | | |
| 生食 500ml 1袋 90分 | | ● | | | | |

胃癌：神経内分泌腺癌用CPT-11+CDDP療法

| | Day (1コース：28日間) | | | |
|--|-----------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 28 |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 90分 | ● | ● | ● | |
| マンニットールS注射液 300mL … 1袋 60分 | ● | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 (後発)ホスアプロビタント点滴静注150mg … 1瓶 30分 | ● | | | |
| パロセトム点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分 | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 イリノケン塩酸塩点滴静注 60mg/m ² 90分 | ● | ● | ● | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 シスプラチナ 60mg/m ² 120分 | ● | | | |
| 生理食塩液(ソフトバッグ) 500mL … 1袋 90分 | ● | ● | ● | |

胃癌 : mFOLFOX6+HER(初回)療法

| | Day (1コースの日数 : 42日) | | | | |
|---|---------------------|----|----|----|----|
| | 1 | 15 | 22 | 29 | 42 |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセフ® チン注射用 8mg/kg 90分 | ● | | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセフ® チン注射用 6mg/kg 30分 | | | ● | | |
| パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg/2mL … 1.5瓶 15分 | ● | ● | | ● | |
| ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※エルプラットと同時 | ● | ● | | ● | |
| ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチニ点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時 | ● | ● | | ● | |
| 生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与 | ● | ● | | ● | |
| 生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用 | ● | ● | | ● | |

46時間

胃癌 : mFOLFOX6+HER(2回目以降)療法

| | Day (1コースの日数 : 42日) | | | | |
|--|---------------------|----|----|----|----|
| | 1 | 15 | 22 | 29 | 42 |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセフ® チン注射用 6mg/kg 30分 | ● | | ● | | |
| パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1.5瓶 15分 | ● | ● | | ● | |
| ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 $200\text{mg}/\text{m}^2$ 120分 ※エルプラットと同時 | ● | ● | | ● | |
| ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリチラチン点滴静注液 $85\text{mg}/\text{m}^2$ 120分 ※レボホリナートと同時 | ● | ● | | ● | |
| 生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 $400\text{mg}/\text{m}^2$ ※全開投与 | ● | ● | | ● | |
| 生理食塩液100ml 5-FU注 $2400\text{mg}/\text{m}^2$ トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用 | ● | ● | | ● | |

46時間

胃癌：S-1+HER療法(初回)

| | Day (1コース：21日間) | | | |
|--|-----------------|------|----|----|
| | 1 | 7 | 15 | 21 |
| 生理食塩液100mL … 1瓶 | ● | | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 ハセプロチン注 8mg/kg 90分 | ● | | | |
| (経口) S-1 80mg/m ² 1日2回 | ● | 14日間 | | |

胃癌：S-1+HER療法(2回目以降)

| | Day (1コース：21日間) | | | |
|--|-----------------|------|----|----|
| | 1 | 7 | 15 | 21 |
| 生理食塩液100mL … 1瓶 | ● | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ハセプロチン注 6mg/kg 30分 | ● | | | |
| (経口) S-1 80mg/m ² 1日2回 | ● | 14日間 | | |

胃癌：HER+CaPeOX療法(初回)

| | Day (1コースの日数：21 日) | | | |
|--|-----------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| (経口) カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 | | 14日間  | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセブチン注射用 8mg/kg 90分 | ● | | | |
| パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 120分 | ● | | | |

胃癌：HER+CaPeOX療法(2回目以降)

| | Day (1コースの日数：21 日) | | | |
|--|-----------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| (経口) カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 | | 14日間  | | |
| 生理食塩液 100mL … 1袋 ハーセフチン注射用 6mg/kg 30分 | ● | | | |
| パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 120分 | ● | | | |

胃癌：HER+SOX療法(初回)

| | Day (1コースの日数：21 日) | | | |
|--|-----------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| (経口) S-1 80mg/m ² 1日2回 | | | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセブ [®] チン注射用 8mg/kg 90分 | ● | | | |
| パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 120分 | ● | | | |

14日間

胃癌：HER+SOX療法(2回目以降)

| | Day (1コースの日数：21日) | | | |
|---|-------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| (経口) S-1 80mg/m ² 1日2回 | | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1袋 ハーセフチン注射用 6mg/kg 30分 | ● | | | |
| パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 120分 | ● | | | |

14日間

胃癌：Nivo療法

| | Day (1コースの日数：28日間) | | |
|---|--------------------|-----|----|
| | 1 | ・・・ | 28 |
| 生理食塩液100mL…100mL カペジーポ点滴静注 480mg/body 30分 全量100mL | ● | | |

胃癌 : mFOLFOX6+Zolbetuximab(初回)療法

| | Day (1コースの日数 : 14日) | |
|---|---------------------|----|
| | 1 | 14 |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセフ®チン注射用 6mg/kg 30分 | ● | |
| パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1.5瓶 ホラミン注 5mg 0.5% 1mL 1管 30分 | ● | |
| 生食 1000mL ビロイ点滴静注 800mg/m ² 75mL/hから開始30分ごとに投与速度を上げる | ● | |
| ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※エルプラットと同時 | ● | |
| ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 オキサリプラチニ点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時 | ● | |
| 生理食塩液 50mL 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与 | ● | |
| 生理食塩液 100mL 5-FU注 2400mg/m ² トータルで 115mL に調整 ※2.5mL/hrでインフューザーポンプ 使用 | ● | |
| 46時間 | | |

胃癌 : mFOLFOX6+Zolbetuximab(2回目以降)療法

| | Day (1コースの日数 : 14日) | |
|---|---------------------|----|
| | 1 | 14 |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセフ®チン注射用 6mg/kg 30分 | ● | |
| パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL 1瓶 デカドロン注射液 6.6mg 2mL … 1.5瓶 ホラミン注 5mg 0.5% 1mL 1管 30分 | ● | |
| 生食 1000mL ビロイ点滴静注 400mg/m ² 38mL/hから開始30分ごとに投与速度を上げる | ● | |
| ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※エルプラットと同時 | ● | |
| ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチニ点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時 | ● | |
| 生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与 | ● | |
| 生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用 | ● | |
| 46時間 | | |

胃癌 : CapeOX+Zolbetuximab療法(初回)

| | Day (1コースの日数: 21 日) | | | |
|--|------------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| (経口) カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 | | 14日間  | | |
| ハロナセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 ホラミン注5mg 1管 30分 | ● | | | |
| 生食 1000mL ビafil点滴静注 800mg/m ² 75mL/hから開始 30分ごとに投与速度を上げる | ● | | | |
| ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 120分 | ● | | | |

胃癌：CapeOX+Zolbetuximab療法(2回目以降)

| | Day (1コースの日数：21日) | | | |
|--|-------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| (経口) カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 | | 14日間  | | |
| ハロナセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL 1.5瓶 ホラミン注5mg 1管 30分 | ● | | | |
| 生食 1000mL ビafil点滴静注 600mg/m ² 56mL/hから開始 30分ごとに投与速度を上げる | ● | | | |
| ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 120分 | ● | | | |

胃癌 : Pemb200mg/body療法

| | Day (1コースの日数 : 21日) | | |
|--|---------------------|-------|----|
| | 1 | · · · | 21 |
| 生理食塩液100ml … 100ml キイトルーダ®点滴静注 200mg/body インラインフィルター使用して投与 全量100ml 30分間で施行 | ● | | |

胃癌 : mFOLFOX6+Nivo療法

| | Day (1コースの日数 : 14日) | | | | |
|---|---------------------|------|---|-----|----|
| | 1 | 2 | 3 | ... | 14 |
| 生理食塩液100ml … 100ml オゾン点滴静注 240mg/body 30分 全量100mL | ● | | | | |
| パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液6.6mg/2ml 1.5瓶 15分 | ● | | | | |
| ブドウ糖注5%250ml 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 120分 ※オキサリプラチンと同時 | ● | | | | |
| ブドウ糖注5%250ml 1袋 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ² 120分 ※レボホリナートと同時 | ● | | | | |
| 生理食塩液 50ml 1瓶 5-FU注 400mg/m ² ※全開投与 | ● | | | | |
| 生理食塩液100ml 5-FU注 2400mg/m ² トータルで115mlに調整 ※2.5ml/hrでインフューザーポンプ 使用 | ● | 46時間 | | | |

胃癌：weekly-PTX療法(7週ごと)

胃癌 : T-Dxd療法

| Day (1コースの日数 : 21日) | | |
|--|---|----|
| | 1 | 21 |
| ハロセトロン点滴バッグ 0.75mg 50mL 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶 インラインフィルター-使用して投与 30分 | ● | |
| ブドウ糖液 5% 100mL … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 エンハーツ点滴静注用 6.4mg/kg 初回90分、2回目以降30分 エンハーツ100mgあたり注射用水5mLで溶解 | ● | |

胃癌 : CapeOX+Pemb療法

| | Day (1コースの日数 : 21 日) | | | |
|---|-------------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| (経口) カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 | | 14日間  | | |
| 生理食塩液 100mL … 1袋 キトルード点滴静注用 200mg/body インラインフィルター使用して投与 30分 | ● | | | |
| ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 120分 | ● | | | |

胃癌 : G-SOX+Pemb療法

| | Day (1コースの日数 : 21 日) | | | |
|---|-------------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| (経口) S-1 80mg/m ² 1日2回 | | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1袋 キトルーダ 点滴静注用 200mg/body インラインフィルター-使用して投与 30分 | ● | | | |
| ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 120分 | ● | | | |

14日間

胃癌 : Pemb+HER+CAPOX療法(初回)

| | Day (1コースの日数: 21 日) | | | |
|---|------------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| (経口) カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 | | 14日間  | | |
| 生理食塩液 100mL … 1袋 キトルード点滴静注用 200mg/body インラインフィルター使用して投与 30分 | ● | | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセフチン注射用 8mg/kg 90分 | ● | | | |
| ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 120分 | ● | | | |

胃癌 : Pemb+HER+CAPOX療法 (2回目以降)

| | Day (1コースの日数 : 21 日) | | | |
|--|-------------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| (経口) カペシタビン1回1000mg/m ² 1日2回 | | 14日間  | | |
| 生理食塩液 100mL … 1袋 キトルード点滴静注用 200mg/body インラインフィルター-使用して投与 30分 | ● | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセフチン注射用 6mg/kg 30分 | ● | | | |
| ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 120分 | ● | | | |

胃癌 : Pemb+HER+SOX療法(初回)

| | Day (1コースの日数: 21 日) | | | |
|--|------------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| (経口) S-1 80mg/m ² 1日2回 | | 14日間  | | |
| 生理食塩液 100mL … 1袋 キトルダ点滴静注用 200mg/body インラインフィルター使用して投与 30分 | ● | | | |
| 生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセフチン注射用 8mg/kg 90分 | ● | | | |
| ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 120分 | ● | | | |

胃癌 : Pemb+HER+SOX療法(2回目以降)

| | Day (1コースの日数: 21 日) | | | |
|---|------------------------|---|----|----|
| | 1 | 8 | 15 | 21 |
| (経口) S-1 80mg/m ² 1日2回 | | 14日間  | | |
| 生理食塩液 100mL … 1袋 キトルード点滴静注用 200mg/body インラインフィルター使用して投与 30分 | ● | | | |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶 ハーセフチン注射用 6mg/kg 30分 | ● | | | |
| ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 1.5瓶 15分 | ● | | | |
| ブドウ糖 5% 500ml 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 120分 | ● | | | |