

# 脳腫瘍

---

改定日 2026. 8

## 脳腫瘍：Bev療法(2週)

|                                                                      | Day (1コースの日数：14日) |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
|                                                                      | 1                 | 14 |
| 生理食塩液 100ml 1瓶<br>アバシン点滴静注用 10mg/kg 全量100mL<br>初回90分、2回目60分、3回目以降30分 | ●                 |    |

# 脳腫瘍：ACNU療法

|                                                                                                       | Day（1コースの日数：42日） |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
|                                                                                                       | 1                | 42 |
| デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶<br>プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL … 1管<br>生理食塩液 100mL … 1瓶<br>ニトラン投与前に                  | ●                |    |
| ブドウ糖注 5% 250mL … 1袋<br>注射用水 20mL … 1管<br>ニトラン注射用 80mg/m <sup>2</sup> ニトラン50mgあたり注射用水10mLで溶解<br>2時間かけて | ●                |    |

## 脳腫瘍：Bev療法(3週)

|                                                                       | Day (1コースの日数：21日) |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
|                                                                       | 1                 | 21 |
| 生理食塩液 100ml 1瓶<br>アバスチン点滴静注用 15mg/kg 全量100mL<br>初回90分、2回目60分、3回目以降30分 | ●                 |    |

# 脳腫瘍：ACNU+Bev療法

|                                                                                                       | Day（1コースの日数：42日） |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|
|                                                                                                       | 1                | 22 | 42 |
| 生理食塩液 100ml 1瓶<br>アバスチン点滴静注用 15mg/kg 全量100mL<br>初回90分、2回目60分、3回目以降30分                                 | ●                | ●  |    |
| デカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶<br>プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL … 1管<br>生理食塩液 100mL … 1瓶<br>コドラン投与前に                  | ●                |    |    |
| ブドウ糖注 5% 250mL … 1袋<br>注射用水 20mL … 1管<br>コドラン注射用 80mg/m <sup>2</sup> コドラン50mgあたり注射用水10mLで溶解<br>2時間かけて | ●                |    |    |

# 脳腫瘍：R-MPV療法①

|                                                                           | Day（1コースの日数：14日） |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|----|
|                                                                           | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
| 生理食塩液 50mL … 1瓶<br>デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶<br>ホウランミン注5mg 0.5%1mL … 1管 ①15分 | ●                |   |   |   |   |   |    |
| 生理食塩液(ソフトバグ) 500mL … 1袋<br>リキサン注375mg/m <sup>2</sup> ②30分毎に順次速度上げて投与可     | ●                |   |   |   |   |   |    |
| (後発)ソラデム輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ③3時間                         |                  | ● |   |   |   |   |    |
| 生理食塩液 100mL … 1瓶<br>(後発)ホスアプレバ点滴静注150mg … 1瓶 ②30分                         |                  | ● |   |   |   |   |    |
| パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋<br>デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶 ③15分             |                  | ● |   |   |   |   |    |
| 生理食塩液 50mL … 1瓶<br>オシロン注射用 1.4mg/m <sup>2</sup> ④全開投与                     |                  | ● |   |   |   |   |    |
| 生理食塩液500mL 【規格分解用】 … 500mL<br>ソラデム点滴 3500mg/m <sup>2</sup> 全量500mL⑤3時間    |                  | ● |   |   |   |   |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑥3時間                           |                  | ● |   |   |   |   |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑦3時間                           |                  | ● |   |   |   |   |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑧3時間                           |                  | ● |   |   |   |   |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml 2管⑨翌日1本目開始までキープ                     |                  | ● |   |   |   |   |    |

# 脳腫瘍：R-MPV療法②

|                                                     | Day（1コースの日数：14日） |   |   |   |   |   |    |
|-----------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|----|
|                                                     | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ①3時間     |                  |   | ● |   |   |   |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ②3時間     |                  |   | ● |   |   |   |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ③4時間     |                  |   | ● |   |   |   |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ④3時間     |                  |   | ● |   |   |   |    |
| ロイコブリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑤側管から<br>メトトレキサート開始24時間後に投与 |                  |   | ● |   |   |   |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑥4時間     |                  |   | ● |   |   |   |    |
| ロイコブリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑦側管から                       |                  |   | ● |   |   |   |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑧3時間     |                  |   | ● |   |   |   |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑦3時間     |                  |   | ● |   |   |   |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑧4時間     |                  |   | ● |   |   |   |    |
| ロイコブリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑨側管から                       |                  |   | ● |   |   |   |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑩4時間     |                  |   | ● |   |   |   |    |
| ロイコブリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑪側管から                       |                  |   | ● |   |   |   |    |

# 脳腫瘍：R-MPV療法③

|                                                         | Day（1コースの日数：14日） |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|----|
|                                                         | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ①4時間         |                  |   |   | ● | ● | ● |    |
| ロイコブリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ②側管から                           |                  |   |   | ● | ● | ● |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ③3時間         |                  |   |   | ● | ● | ● |    |
| ロイコブリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ④側管から                           |                  |   |   | ● | ● | ● |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑤6時間         |                  |   |   | ● | ● | ● |    |
| ロイコブリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑥側管から                           |                  |   |   | ● | ● | ● |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml … 2管 ⑦6時間         |                  |   |   | ● |   | ● |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml 2管 ⑦翌日の1本目開始までキープ |                  |   |   |   | ● |   |    |
| ロイコブリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑧側管から                           |                  |   |   | ● | ● | ● |    |
| KN補液3号輸液 500mL … 1袋<br>メイロン静注 7% 20ml 2管 ⑨翌日1本目開始までキープ  |                  |   |   | ● |   |   |    |
| ロイコブリン注3mg 0.3%1mL … 5管 ⑩側管から                           |                  |   |   | ● |   |   |    |



# 脳腫瘍：HD-AraC療法

|                                                                  | Day（1コースの日数：28日） |    |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----|
|                                                                  | 1                | 28 |
| グラネトロン点滴バッグ 3mg100mL … 1袋<br>デカトロン注射液6.6mg 2mL … 1.5瓶<br>30分     | ●                |    |
| 生理食塩液500m l 500ml<br>ホサトロン注 2000mg/m <sup>2</sup> 全量500ml<br>3時間 | ●                |    |

# 脳腫瘍：VCR + CBDCA療法

|                                                                                                     | Day（1コース：7日間） |   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----|----|
|                                                                                                     | 1             | 8 | 15 | 21 |
| パロノセトロン点滴静注パック <sup>®</sup> 0.75mg/50mL … 1袋<br>アロカス点滴静注235mg … 1瓶<br>テカトロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶<br>30分 | ●             |   |    |    |
| 生食 50mL 1瓶<br>マンギン注 1.5mg/m <sup>2</sup><br>全開                                                      | ●             |   |    |    |
| ブドウ糖注 5% 500mL … 1袋<br>カルボプラチン注 550mg/m <sup>2</sup><br>60分時間                                       | ●             |   |    |    |

# 脳腫瘍：VCR療法

|                                                               | Day（1コース：7日間） |   |    |    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---|----|----|
|                                                               | 1             | 8 | 15 | 21 |
| パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg50mL … 1袋<br>テカドロン注射液6.6mg 2mL … 1瓶<br>15分 | ●             |   |    |    |
| 生食50mL 1瓶<br>マネキン注 1.5mg/m <sup>2</sup><br>全開                 | ●             |   |    |    |